

Ueber einige Sulfoderivate  
des  
**Pseudocumols.**

---

Inaugural - Dissertation

der  
philosophischen Facultät der Universität Rostock

vorgelegt

von

**Dr. phil. J. Radloff.**

---

**Rostock.**

Carl Boldt'sche Hof-Buchdruckerei.

1877.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Dass ein Cumol, d. h. ein Kohlenwasserstoff von der Formel  $C_9H_{12}$  im Steinkohlentheeröl vorkomme, ist zuerst von Mansfield<sup>1)</sup> behauptet worden. Indess wurde sowohl er, wie später Ritthausen<sup>2)</sup>, Church<sup>3)</sup> durch unrichtige Beobachtungen zu dieser Ansicht geführt, insofern das angebliche Cumol in Wirklichkeit wesentlich ein Gemenge von den verschiedenen Xylole war.

Nach unseren jetzigen Kenntnissen der Theerölkohlenwasserstoffe müsste Mansfield's Cumol, wenn sein Siedepunkt wirklich bei  $140-145^\circ$  lag, hauptsächlich aus dem kürzlich von O. Jacobsen<sup>4)</sup> im Theeröl nachgewiesenen Orthoxylol bestanden haben. Das Theercumol von Warren de le Rue<sup>5)</sup> vom angeblichen Siedepunkt  $169^\circ$  bestand wenigstens zum grossen Theil aus Kohlenwasserstoffen von der Formel  $C_9H_{12}$ . Es muss nämlich im Wesentlichen ein Gemenge von Mesitylen, Pseudocumol und dem bei  $170^\circ$  siedenden Dekan (O. Jacobsen)<sup>6)</sup> gewesen sein.

Beilstein und Kögler<sup>7)</sup> stellten zuerst das Gemenge der beiden Kohlenwasserstoffe  $C_9H_{12}$  annähernd rein dar, hielten es für eine homogene Substanz, die sie Pseudocumol nannten, und für die sie den Siedepunkt  $166^\circ$  angaben. Dass dieses Beilstein'sche Theercumol eben noch ein Gemenge sei, stellte Fittig<sup>8)</sup> durch die Trennung der Nitroderivate fest. Den neben Mesitylen in jenem Gemenge enthaltenen Kohlenwasserstoff, welchen nunmehr

---

<sup>1)</sup> Annal. 69, Seite 179.

<sup>2)</sup> J. pr. Chem. 61, Seite 79.

<sup>3)</sup> Jahresbericht 1855, Seite 635.

<sup>4)</sup> Berliner B. 1877, Seite 1010.

<sup>5)</sup> Jahresbericht 1865, Seite 515.

<sup>6)</sup> Annal. 184, Seite 203.

<sup>7)</sup> Annal. 133, Seite 32.

<sup>8)</sup> Annal. 151, Seite 292.

der Name Pseudocumol zufiel, stellte er dann synthetisch in reinem Zustande dar und gab über seine Constitution Aufschluss.

Aus dem Theeröl ist reines Pseudocumol kürzlich von O. Jacobsen<sup>1)</sup> dargestellt worden, und zwar einerseits aus dem Amid der Pseudocumolsulfonsäure, welches sich von dem analogen Mesitylenderivat durch Krystallisation aus Alkohol leicht trennen lässt, anderseits aus der krystallisirten Sulfonsäure selbst, deren relative Schwerlöslichkeit in verdünnter Schwefelsäure wenigstens die Trennung der Hauptmenge des Pseudocumols von den begleitenden Mesitylen ermöglicht.

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass auch das sogenannte Retinyl von Pelletier und Walter,<sup>2)</sup> welches sie durch Destillation des Harzes von *Pinus maritima* erhielten, und welchem sie die Formel  $C_9H_{12}$  beileigten, neben niedriger siedenden Kohlenwasserstoffen Pseudocumol enthielt.

Auch von dem Cumol (Siedepunkt  $164-168^\circ$ ), welches Cahours<sup>3)</sup> aus dem rohen Holzgeist isolirte, darf angenommen werden, dass es wenigstens zum Theil aus Pseudocumol bestand. Jedenfalls ist dies wahrscheinlicher, als die von Cahours behauptete Identität seines zweiten, bei  $148^\circ$  siedenden Cumols mit dem Cumol der Cuminsäure.

Pseudocumolhaltige Gemische wurden auch aus Campfer und Chlorzink von Fittig, Koebrich und Jilke<sup>4)</sup> dargestellt.

Mit Sicherheit ist endlich kürzlich von O. Jacobsen<sup>5)</sup> die Identität des früher sogenannten Phoron-Cumols mit dem Pseudocumol nachgewiesen.

Was das Studium der Pseudocumolderivate betrifft, so beziehen sich die bisher vorliegenden Angaben nur

<sup>1)</sup> Annal. 184, Seite 179.

<sup>2)</sup> Annal. 67, Seite 269.

<sup>3)</sup> Annal. 76, Seite 286.

<sup>4)</sup> Annal. 145, Seite 137.

<sup>5)</sup> Berichte des Berliner C. 1877, Seite 855.

zum kleinen Theil auf die aus reinem Pseudocumol dargestellten Verbindungen. Hierher gehören die Arbeiten von Fittig und Laubinger<sup>1)</sup>, welche aus dem synthetisch dargestellten Pseudocumol die Mono- und Trinitroverbindung, das Mono- und das Tribrompseudocumol gewannen.

Reine Pseudocumolderivate sind ferner die oben erwähnten Verbindungen, vermittelt deren O. Jacobsen die Isolirung des Pseudocumols aus Steinkohlentheeroel bewirkte.

Eine grosse Anzahl früherer Untersuchungen bezieht sich auf Gemenge von Verbindungen, wie sie aus dem damals für homogenes Theercumol gehaltenen Gemenge erhalten wurden.

Dies zeigen die Arbeiten von Beilstein und Kögler<sup>2)</sup>, welche z. B. die so gut krystallisirende Monobromverbindung des Pseudocumols erst durch Destillation von anhängenden andern Bromverbindungen trennen mussten, ferner die von ihnen beschriebenen Salze der Cumolschwefelsäure und das Säurechlorid, welches Letzteres sie nur in oeliger Form erhielten.

Von Herrn Professor Dr. Jacobsen wurde ich nun gütigst darauf hingeführt, dass sich eine Bearbeitung einiger Derivate des Pseudocumols lohnen würden, da dasselbe jetzt verhältnissmässig leicht chemisch rein zu erhalten ist. Zur Gewinnung des reinen Ausgangsmaterials wurde ein hochsiedendes Steinkohlentheeroel vom Siedepunkt 150 — 170° verschiedene Male der fractionirten Destillation unterworfen und zwar zuletzt ein Destillat vom constanten Siedepunkt 164 — 167° daraus isolirt, worauf nach der Methode des Herrn Professor Dr. Jacobsen die reine Sulfonsäure durch wiederholte Umkrystallisation gewonnen wurde.

Als erstes Derivat und Ausgangspunkt für die übrigen stellte ich dar das

---

<sup>1)</sup> Annal. 151, Seite 260.

<sup>2)</sup> Annal. 137, Seite 318.

### Pseudocumolsulfochlorid $C_9H_{11}SO_2Cl$ .

Beilstein<sup>1)</sup> beschreibt das Pseudocumolsulfochlorid als eine oelige Flüssigkeit. Er ging aber bei der Darstellung nicht von reinem Pseudocumol aus, sondern von dem Gemisch vom Siedepunkt  $164-167^\circ$ , folglich muss er auch Mesitylensulfochlorid unter Händen gehabt haben. Um reines Pseudocumolsulfochlorid zu erhalten, ging ich von der in Würfeln krystallisirten Pseudocumolsulfonsäure aus, entfernte durch kohlen sauren Baryt die anhaftende Schwefelsäure und stellte mir das Natriumsalz dar. Letzteres wurde nun vollständig getrocknet und mit äquivalenten Mengen Phosphorpentachlorid zusammen gerieben. Die zuerst flüssige Mischung erstarrte beim Erkalten zu einer festen Masse. Dieselbe wurde zur Entfernung der unorganischen Bestandtheile mit Wasser ausgeknetet, dann in Aether gelöst, diese Lösung 24 Stunden unter häufigem Umschütteln mit Chlorkalcium stehen gelassen. Aus der abfiltrirten Lösung krystallisirte es beim Verdunsten in grossen bis 5 cm. langen wasserhellen Säulen mit schiefer Endfläche (monoklinisches System). Es schmilzt bei  $61^\circ C$ .

### Pseudocumolschwefligesäure $C_9H_{11}SO_2H$ .

Die Darstellung der Sulfinsäure geschah nach den Angaben von Schiller und Otto<sup>2)</sup>, indem nämlich das Chlorid unter Wasser durch Behandlung mit Zinkstaub in das Zinksalz der Pseudocumolschwefligesäure übergeführt wurde. Dieses Zinksalz wurde durch kohlen saures Natrium in das Natriumsalz verwandelt und die Lösung des letzteren auf dem Wasserbade concentrirt. Nach dem vollständigen Erkalten schied sich auf Zusatz von Salzsäure die Pseudocumolschwefligesäure in Form einer festen, krystallinischen weissen Masse ab. Irgend welche oelige Nebenproducte traten hierbei nicht auf. Die so erhaltene rohe Säure wurde durch Auswaschen mit Wasser von

<sup>1)</sup> Annal. 137, Seite 317.

<sup>2)</sup> Ber. d. d. chem. Gesellsch. 1876, S. 1584.

Chlornatrium befreit. Beim Erkalten der heissen wässrigen Lösung krystallisirte die reine Säure in schönen langen Nadeln aus. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 98 C.

Die Analyse der Pseudocumolschwefligensäure ergab Folgendes:

0,226 grm. Substanz gaben 0,227 Ba.  $\text{SO}_4$  =  
17,43 % S.

berechnet 17,39 % S.

Die krystallisirte Säure enthält kein Krystallwasser. Ihr Gewicht blieb constant, nachdem die Substanz ungefähr 4 Stunden bei 80° C. erhitzt war. Der Luft ausgesetzt hält sich die reine krystallisirte Säure sehr lange, ohne dass eine Veränderung durch Oxydation eintritt; die feuchte rohe Säure dagegen verwandelt sich durch Einwirkung der Luft nach einigen Stunden in eine flüssige Masse.

### Salze der Pseudocumolschwefligensäure.

**Pseudocumolschwefligsaures Natron  $\text{C}_9 \text{H}_{11} \text{SO}_2 \text{Na}$**   
wurde dargestellt durch Neutralisation der reinen Säure mit kohlensaurem Natrium. Es ist leicht löslich im Wasser und krystallisirt in rechtwinklichen Täfelchen.

### Ammoniaksalz $\text{C}_9 \text{H}_{11} \text{SO}_2 \text{NH}_4$

äusserst leicht löslich. Die wässrige Lösung trocknete zu einer undeutlichen krystallynischen Masse ein.

Ausser dem Natrium und Ammoniaksalz wurden von den Salzen der Sulfinsäure noch genauer untersucht und analysirt das Baryum und das Silbersalz.

### Das Baryumsalz $(\text{C}_9 \text{H}_{11} \text{SO}_2)_2 \text{Ba}$

stellte ich dar, indem ich die Säure mit Aetzbaryt in der Wärme digerirte. Darauf zur Entfernung des überschüssigen Baryts  $\text{CO}_2$  hineingeleitete, den Ba  $\text{CO}_3$  abfiltrirte, das Filtrat auf dem Wasserbade concentrirte und zur Krystallisation stellte. Die erhaltenen Krystalle traten in Form von dünnen feinen rhombischen Tafeln auf. Das Löslichkeitsverhältniss des Barytsalzes ist bei der Temperatur von 7° C ungefähr 1 : 20; die über Schwefelsäure

bei gewöhnlicher Temperatur getrocknete Substanz verlor nicht an Gewicht beim Trocknen bei  $150^{\circ}\text{C}$ . Das Salz ist also wasserfrei. Analyse des Baryumsalzes.

0,2345 grm. Substanz gaben

0,1072 Ba.  $\text{SO}_4 = 27.10\%$  Ba.

berechnet  $27.2\%$  Ba.

### **Pseudocumolschwefligsaures Silber $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{SO}_2\text{Ag}$ .**

Das Silbersalz ist in Wasser schwer löslich. Es wurde daher dargestellt durch Doppelzersetzung aus dem Natriumsalz durch  $\text{AgNO}_3$  und krystallisirte in deutlichen rechtwinklichen Blättchen.

Die Analyseergab für 0,213 grm. Substanz 0,0788 grm. metallisches Silber  $= 36.99\%$  Ag. berechnet  $37.11\%$  Ag.

### **Sulphydrat des Pseudocumols $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{SH}$ .**

Zur Darstellung des Sulphydrats schlug ich zunächst das Verfahren ein, welches Schiller und Otto<sup>1)</sup> bei der Darstellung des Paratoluolsulphydrats anwandten, unter Beobachtung aller von ihnen erwähnten Vorsichtsmaßregeln, indem ich besonders darauf achtete, dass die Eintragung des rohen pseudocumolschwefligsauren Natriums in eine lebhafte Wasserstoff-Entwicklung von Zink und Salzsäure bei einer möglichst wenig erhöhten Temperatur geschah, zu welchem Zweck ich den Kolben in eine Kältemischung stellte.

Wider Erwarten bildete sich nicht das verlangte Sulphydrat, sondern ein Gemisch anscheinend von Sulphydrat und Sulfid, welches ich nicht durch Krystallisation zu trennen vermochte. Ich wandte nun ein Verfahren an, welches Otto neuerdings in den Berliner chemischen Berichten<sup>2)</sup> vorgeschlagen hat, indem ich aus der nach Schillers Methode erhaltenen Mischung von Sulphydrat und Disulfid das Disulfid in die Zinkverbindung des Sulphydrats überführte, aus welcher Verbindung ich auf Zusatz von Salzsäure das Sulphydrat durch Destillation gewann.

<sup>1)</sup> Dt. chem. Ges. IX., 1588.

<sup>2)</sup> Dt. chem. Ges. 1877, S. 939.

Das Destillat zeigte beim Erkalten flockige Ausscheidungen, die aus Alkohol umkrystallisirt rechtwinkliche Blättchen lieferte. Der Schmelzpunkt ist  $85^{\circ}\text{C}$ .

Bei der Reaction des Sulfhydrats

- 1) mit essigsauerm Blei zeigt sich ein gelber Niederschlag, welcher in Wasser und Alkohol unlöslich ist;
- 2) mit salpetersauerm Silber erfolgt ein rothgelber Niederschlag, der ebenfalls in Wasser und Alkohol unlöslich ist;
- 3) mit Quecksilberchlorid giebt das Sulfhydrat einen feinen weissen Niederschlag, welcher in Wasser unlöslich, in heissem Alkohol löslich ist und daraus in feinen Nadeln krystallisirt. Analyse der Quecksilberverbindung:

0,316 grm. Substanz gaben 0,146 Hg S.

dies entspricht  $39.67\%$  Hg.

berechnet  $39.8\%$  Hg.

### Pseudocumoldisulfid ( $\text{C}_9\text{H}_{11}$ )<sub>2</sub>S<sub>2</sub>.

Schiller giebt in seiner Dissertation an, dass Phenylbisulfür in leichter und glatter Weise entstehe, wenn die theoretisch erforderlichen Mengen von Säure und Sulfhydrat mit Wasser in einem mit Steigerrohr versehenen Kolben erhitzt würden. Weiter giebt er an zur Darstellung des Paratoluolbisulfür, es entstehe dieses unter Austritt von Wasser, wenn man drei Moleküle des Sulfhydrats mit einem Molekül der Paratoluolschwefligensäure im zugeschmolzenen Glasrohr auf  $110^{\circ}\text{C}$ . erhitze. Beide Methoden versuchte ich für die Darstellung des Pseudocumoldisulfids zu verwerthen, fand jedoch meine Erwartung getäuscht, da sowohl beim Kochen mit Wasser nach sechs Stunden als auch beim Erhitzen ohne Wasser im geschlossenen Glasrohr auf  $140^{\circ}\text{C}$ . meine beiden Componenten sich nicht oder wenigstens bei Weitem nicht vollständig zersetzten. Aus dem Reactionsproduct liess sich immer noch die Quecksilberverbindung des Sulfhydrats er-

halten. Anderseits zog kohlensaures Natrium aus dem Reactionsproduct noch unveränderte Sulfinsäure aus.

Ich brachte nun Sulfhydrat sowohl als Säure mit absoluten Alkohol in ein Glasrohr, schmolz dieses zu und erhitzte es fünf Stunden hindurch auf  $140^{\circ}$  C. Nach dem Erkalten hatten sich kleine Krystalle ausgeschieden, die keine Quecksilberverbindung gaben, sich in kohlensaurem Natrium nicht lösten und bei  $115^{\circ}$  C. schmolzen.

Die Analyse ergab für

$$0,282 \text{ grm. Substanz } 0,425 \text{ BaSO}_4 = \\ 20 \cdot 85\% \text{ S.}$$

Die Formel des Pseudocumoldisulfids verlangt:

$$21 \cdot 19\% \text{ S.}$$



Schliesslich empfinde ich es als ein hohes Bedürfniss,  
dem sehr verehrten Herrn Professor Dr. Jacobsen für  
die mir bereitwilligst geliehene Unterstützung bei meinen  
Arbeiten im Laboratorio und für das Thema dieser vor-  
liegenden Dissertation den besten Dank auszusprechen.

Rostock, im October 1877.

Hochachtungsvoll ergebenst

**J. Radloff.**

